

## **ALGORITMOS** RCP AHA 2020

VERSIÓN 5 - 03/06/2023

DESCARGABLES EN ESTE ENLACE:

https://www.urgenciasyemergen.com/sdm\_downloads/algoritmos-rcp-aha-2020-adultos-ypediatria/

Actualización AHA 2020: nuevas recomendaciones RCP y atención cardiovascular de emergencia por Elena Plaza Moreno - Urgencias y Emergencias



Escanea el código QR o haz clic en la imagen para acceder al análisis

de mi web






# Adultos






### Algoritmo de soporte vital básico en adultos






## Algoritmo de paro cardiaco en adultos





### Algoritmo recuperación de la circulación espontánea



#### Fase inicial de estabilización

La reanimación continúa durante la fase posterior al RCE, y muchas de estas actividades pueden ocurrir simultáneamente. Sin embargo, si se debe establecer una priorización, siga estos pasos:

- Manejo de la vía aérea: Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal
- Manejo de los parámetros ventilatorios: ajuste la FIO<sub>2</sub> para la SpO<sub>2</sub> en un 92% a un 98%; comience con 10 ventilaciones/min. Ajuste a una PaCO<sub>2</sub> de 35 a 45 mm Hg.
- Manejo de los parámetros hemodinámicos: administre cristaloides o vasopresores o inotrópicos para la presión arterial sistólica objetivo de >90 mm Hg o la presión arterial media de >65 mm Hg.

### Control continuo y prácticas de emergencia adicionales

Estas evaluaciones deben realizarse simultáneamente para que las decisiones sobre manejo específico de la temperatura (MET) reciban una alta prioridad como intervenciones cardíacas.

- Intervención cardíaca de emergencia: Evaluación temprana de un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones; considere la hemodinamia para la toma de decisiones sobre la intervención cardíaca.
- MET: si el paciente no está siguiendo órdenes, inicie el MET lo antes posible; comience a una temperatura de entre 32 °C y 36 °C durante 24 horas utilizando un dispositivo de refrigeración con un bucle de retroalimentación.
- · Otros tratamientos críticos.
  - Monitoree continuamente la temperatura central (esofágica, rectal, de la vejiga).
  - Mantenga la normoxemia, la normocapnia y la euglucemia.
  - Monitoree el electroencefalograma (EEG) de forma continua o intermitente.
  - Proporcione ventilación de protección pulmonar.

#### Las H y T

**H**ipovolemia

**H**ipoxia

Hidrogenión (acidosis)

Hipopotasemia/hiperpotasemia

**H**ipotermia

Tensión, neumotórax (a tensión)

Taponamiento cardíaco


**T**oxinas

Trombosis pulmonar

Trombosis coronaria

### Urgencias y

## Algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para reanimadores legos



\*En el caso de víctimas adultas y adolescentes con emergencias relacionadas con el consumo de opiáceos, el rescatador entrenado debe realizar RCP con compresiones y ventilaciones. Si no está entrenado en realizar ventilaciones, debe realizar RCP solo con las manos. En el caso de lactantes y niños, la RCP debe incluir compresiones con ventilaciones de rescate.


© 2020 American Heart Association

© 2020 American Heart Association

### Algoritmo de emergencia asociada al consumo de opiáceos para profesionales de la salud



# Enfoque recomendado para el neuropronóstico multimodal en pacientes adultos después de un paro cardíaco




## Nuevas cadenas de supervivencia adultos (intra y extrahospitalaria)







## Algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario para el paro cardíaco en el embarazo



#### Paro cardíaco en una mujer embarazada

- La planificación del equipo debe realizarse en colaboración con los servicios de obstetricia, neonatales, de emergencia, anestesiología, cuidados intensivos y paro cardíaco.
- Las prioridades para las mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro de RCP de alta calidad y alivio de compresión aortocava con desplazamiento uterino lateral.
- El objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados maternales y fetales.
- Lo ideal es que realice una cesárea perimortem en 5 minutos, según los recursos de los profesionales y sus habilidades.

#### Manejo avanzado de la vía aérea

- En el embarazo, es común tener una vía aérea dificultosa. Recurra al profesional con más experiencia.
- Haga intubación endotraqueal o use un dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Utilice la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.
- Una vez colocado el dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

### Posible etiología del paro cardíaco en una mujer embarazada


- A: complicaciones con la anestesia.
- B: sangrado.
- C: cardiovascular.
- D: drogas.
- E: embolia.
- F: fiebre.
- **G:** causas generales no obstétricas del paro cardíaco (las H y las T).
- H: hipertensión.

# Pediatria






### Algoritmo de soporte vital básico en pediatría con 1 reanimador






### Algoritmo de soporte vital básico en pediatría con 2 reanimadores





## Algoritmo de paro cardiaco pediátrico



cardíaco.

#### Calidad de la RCP

- Comprima fuerte (≥½ del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (de 100 a 120/min) y permita una expansión torácica completa.
- Reduzca al mínimo las interrupciones entre compresiones.
- Cambie al compresor cada 2 minutos o antes, si está cansado.
- Si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación compresiónventilación debe ser de 15:2.
- Si se cuenta con una vía aérea avanzada, realice compresiones continuas y suministre una ventilación cada 2 a 3 segundos.

### Energía de descarga para desfibrilación

- · Primera descarga 2 Joules/kg
- Segunda descarga 4 Joules/kg
- Descargas posteriores ≥4 Joules/kg, con un máximo de 10 Joules/kg o la dosis para adultos

#### Farmacoterapia

- Dosis IV/IO de adrenalina:

   0,01 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 0,1 mg/ml). Dosis máxima de 1 mg. Repita cada 3 a 5 minutos. Si no hay acceso vía IV/IO, puede administrar una dosis endotraqueal: 0,1 mg/kg (0,1 ml/kg de concentración de 1 mg/ml).
- Dosis IV/IO de amiodarona: bolo de 5 mg/kg durante el paro cardíaco. Se puede repetir hasta 3 dosis totales para la FV refractaria o TV sin pulso. o bien

**Dosis IV/IO de lidocaína:** Inicial: dosis de carga de 1 mg/kg.

#### Manejo avanzado de la vía aérea


- Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.
- Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.

#### Causas reversibles

- Hipovolemia
- Hipoxia
- Hidrogenión (acidosis)
- **H**ipoglucemia
- Hipo-/hiperpotasemia
- Hipotermia
- Tensión, neumotórax (a tensión)
- Taponamiento cardíaco
- Toxinas
- Trombosis pulmonar
- · Trombosis coronaria




## Algoritmo de taquicardia pediátrica con pulso





### Algoritmo de bradicardia pediátrica con pulso





## Lista de comprobación de atención posparo cardiaco pediatría

| Componentes de la atención posparo cardíaco   | Compruebe |
|---|-----------|
| Oxigenación y ventilación   |           |
| Mida la oxigenación y alcance una normoxemia de entre un 94% y un 99% (o la saturación de oxígeno normal o adecuada para un niño).  |           |
| Mida y alcance una ${\sf Paco}_2$ adecuada para la afección subyacente del paciente y limite la exposición a hipercapnia o hipocapnia graves.   |           |
| Monitoreo hemodinámico  |           |
| Establezca objetivos hemodinámicos específicos durante el atención posparo cardíaco y revíselas a diario.   |           |
| Supervise con telemetría cardíaca.  |           |
| Supervise la presión arterial.  |           |
| Supervise el lactato sérico, la diuresis y la saturación venosa central de oxígeno para ayudar a guiar los tratamientos.  |           |
| Utilice bolos parenterales de líquidos con o sin agentes inotrópicos o vasopresores para<br>mantener una presión arterial sistólica por encima del quinto percentil para la edad y el sexo. |           |
| Manejo específico de la temperatura (MET)   |           |
| Mida y supervise continuamente la temperatura central.  |           |
| Prevenga y trate la fiebre inmediatamente después del paro y durante el recalentamiento.  |           |
| Si el paciente está comatoso, aplique MET (entre 32 °C y 34 °C) seguido de (entre 36 °C y 37,5 °C) o solamente MET (entre 36 °C y 37,5 °C).   |           |
| Evite los escalofríos.  |           |
| Supervise la presión arterial y trate la hipotensión durante el recalentamiento.  |           |
| Neurosupervisión  |           |
| Si el paciente presenta encefalopatía y hay recursos disponibles, supervise mediante un<br>electroencefalograma continuo.   |           |
| Trate las convulsiones.   |           |
| Considere la obtención temprana de imágenes cerebrales para diagnosticar las causas tratables del paro cardíaco.  |           |
| Electrolitos y glucosa  |           |
| Mida la glucemia y evite la hipoglucemia.   |           |
| Mantenga los electrolitos dentro de los rangos normales para evitar posibles arritmias potencialmente mortales.   |           |
| Sedación  |           |
| Trate con sedantes y ansiolíticos.  |           |
| Pronóstico  |           |
| Siempre considere varias modalidades (clínicas y otras) sobre cualquier factor predictivo único.  |           |
| Recuerde que las evaluaciones pueden verse alteradas por MET o por hipotermia inducida.   |           |
| Considere el electroencefalograma junto con otros factores dentro de los primeros 7 días<br>después del paro cardíaco.  |           |
| Considere la adquisición de neuroimágenes, como la resonancia magnética, durante los primeros 7 días.   | П         |



## Nuevas cadenas de supervivencia pediatrica (intra y extrahospitalaria)

#### **PCIH**



#### **PCEH**



Los algoritmos nuevos que no vienen en el documento: "Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE"





## CAMBIOS EN ALGORITMOS NO RECOGIDOS EN EL DOCUMENTO DE ASPECTOS DESTACADOS

Como os cuento en la entrada de mi web que aparece en la portada de este documento (que podéis ver <u>aquí</u> y al final de esta página), en la que analizo la actualización de AHA del 2020: no todos los cambios ni los algoritmos vienen en el documento Aspectos destacados de las guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y ACE.

¿Por qué? No lo sé. Para ver estos cambios, accede a la entrada que te comento. Te adelanto que se han cambiado algunos aspectos del algoritmo de taquicardias, bradicardias, SCA y ACV. De todos, solo tenía bradicardias y taquicardias y en inglés. Así que he traducido estos dos para incluirlos en esta nueva versión del documento.



Escanea el código QR o haz clic en la imagen para acceder al analisis de mi web








### Algoritmo taquicardia adultos 2020

Traducción propia

Algoritmo de taquicardia con pulso en el adulto




- Se ha movido el acceso IV y el ECG de 12 derivaciones al paso 2 (antes en el algoritmo).
- Se añade un nuevo recuadro para la taquicardia refractaria y saber qué hacer si la cardioversión sincronizada no funciona o si la taquicardia con QRS ancho no cede con la infusión de adenosina/antiarrítmico.
- Han eliminado la recomendación de dosis de energía para cada tipo de taquicardia.



### Algoritmo bradicardia adultos 2020

Traducción propia

Algoritmo de Bradicarida en el adulto



- La dosis de atropina cambió de 0.5 mg a 1 mg.
- La dosis de dopamina cambió de 2-20 mcg/kg por minuto a 5-20 mcg/kg por minuto.
- En "Identificar y tratar la causa subyacente", se añadió "Considerar las posibles causas hipóxicas y toxicológicas".
- En "Atropina", el marcapasos transcutáneo tiene "y/o" para la dopamina o la adrenalina (antes solo ponía "o", dando como posible poner solo una de las tres cosas. De estas forma, aceptan la combinación de la terapia eléctrica y la farmacológica.

## SUSCRIBETE

SOMOS DEL #EQUIPOEXCELENCIA Y NO SE NOS ESCAPA UN PROTOCOLO DE RCP, UNA ACTUALIZACIÓN SOBRE ALGUNA GUÍA DE ARRITMIAS NI NINGÚN ARTÍCULO INTERESANTE ③.

MENSUALMENTE TE IRÉ ENVIANDO
UN CORREO ELECTRÓNICO CON LAS
NOVEDADES DE URGENCIAS Y
EMERGENCIAS E INFORMACIÓN QUE
SÉ QUE VA A INTERESARTE. SOLO
TIENES QUE COMPLETAR Y ENVIARME
UN FORMULARIO CON TU EMAIL PARA
NO PERDERTE NADA:



